

Ukazatel úspěšnosti a očekávané odpovědi	Možnosti na národní úrovni	Kompetentní	Vyžaduje zlepšení
47. Uveďte alespoň 2 možné kontraindikace kojení pro dítě a 2 pro matku.	Otázka nebo případová studie		
<p><u>Kontraindikace na straně matky:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HIV, když matky nemohou během kojení dodržovat léčbu nebo pokud vnitrostátní zdravotní orgány nedoporučují kojení pro matky nakažené HIV. ✓ Virus ebola. ✓ Virus herpes simplex typu 1 – aktivní a na prsou. ✓ Specifické matčiny léky, látky a nemoci (viz doporučení WHO „Acceptable medical reasons...“). <p><u>Kontraindikace na straně kojence.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Galaktosemie. ✓ Vrozený nedostatek laktázy. ✓ Některé vrozené poruchy metabolismu mohou vyžadovat dokrmování (fenylketonurie, nemoc javorového sirupu). 			
48. Popište alespoň 4 lékařské indikace pro dokrmování kojených novorozenců: 2 indikace na straně matky a 2 indikace na straně novorozence, když se kojení nezlepší po kvalifikovaném posouzení a vedení.	Otázka nebo případová studie		
<p><u>Indikace na straně kojence:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hypoglykemie. ✓ Znamky nebo příznaky, které mohou signalizovat nedostatečný příjem mléka (významná dehydratace, ztráta hmotnosti nebo opožděné vyprázdnění střev). ✓ Hyperbilirubinemie spojená se špatným příjmem mateřského mléka navzdory vhodné intervenci. ✓ Některé vrozené poruchy metabolismu. <p><u>Indikace na straně matky:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Opožděná laktogeneze vedoucí k nedostatečnému příjmu ze strany dítěte. ✓ Nedostatečná tvorba mléka z důvodu nedostatku tkáně mléčné žlázy. ✓ Patologický stav prsu nebo předchozí operace prsu s následkem nedostatečné tvorby mléka. ✓ Dočasné oddělení matky a dítěte, přičemž není k dispozici odstříkané mléko. ✓ Dočasné přerušování kojení. ✓ Nesnesitelná bolest během krmení. 			
49. Popište alespoň 3 rizika podávání jakéhokoli jiného pokrmu nebo tekutiny než mateřského mléka kojenému dítěti bez lékařské indikace.	Otázka nebo případová studie		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Může to narušit nástup tvorby mléka. ✓ Snižuje schopnost dítěte sát z prsu, což může vést k vytvoření cyklu nedostatku mléka a dokrmování. ✓ Dokonce i jedna dávka kojenecké výživy významně mění střevní mikroflóru. 			